

SHIGÍS QARATERÉN KÓLI AQ DÓNMAÑLAY BIOEKOLOGIYASI HÁM
BALIQSHILIQ XÓJALIĞINDAĞI ÁHMIYETI

Kochanov D¹

Genjebaev M²

1. Ózbekistan mámleketlik dene tárbiya hám sport universiteti Nókis filiali.

2. Berdaq atındağı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18363206>

Annotatsiya. *Bul maqalada Amiwdárya tómengi agımı suw hawızleriniń biri bolǵan Qaraqalpaaqstannıń arqa-shıǵıs tárepi aymaǵındaǵı Shıǵıs Qarateren kólinde tarqalǵan dominant otxor balıq túri bolǵan Aq dónmañlay (Hypotthalmichthys molitrix) balıǵınıń jasqa baylanıslı morfologik belgileri, ósiw hám rawajlanıw kórsetkishleri haqqında maǵlıwmatlar berilgen. Izertlew maqsetinde kólden uslangan balıq shabaqlarınıń hám hártúrli jastaǵı aq dónmañla balıǵınıń dene uzınlıǵı, salmaǵı hám morfologik belgileri maksimal, minimal hám minimal belgiler menen salıstırmalı kórsetilgen bolıp tabıladı.*

Tayanış sózler: *dominant, plastic, meristic, standart uzınlıq, minumum, maksimum, ixtiologik metod, dorsal, antidorsal,*

Аннотация. *В данной статье представлена информация о возрастных морфологических признаках, показателях роста и развития белого толстолобика (Hypotthalmichthys molitrix), доминантного травоядного вида рыб, распространенного в Восточном Каратаванском озере в северо-восточной части Каракалпакстана, являющемся одним из водоемов низовьев Амударьи. С целью исследования были сопоставлены длина тела, масса и морфологические признаки мальков и белого толстолобика разного возраста с максимальными, минимальными и минимальными признаками.*

Ключевые слова: *доминантный, пластический, меристический, стандартная длина, минимум, максимум, ихтиологический метод, дорсальный, антидорсальный.*

Abstract. *This article provides information on the age-related morphological characteristics, growth, and development indicators of the dominant herbivorous fish species, the White Sturgeon (Hypotthalmichthys molitrix), distributed in Lake Eastern Karateran in the northeastern part of Karakalpakstan, one of the water bodies of the lower reaches of the Amu Darya River. For the purpose of the study, the body length, weight, and morphological characteristics of fingerlings caught in the lake and grass carp of different ages were compared with maximum, minimum, and minimum characteristics.*

Keywords: *dominant, plastic, meristic, standard length, minimum, maximum, ichthyological method, dorsal, antidorsal.*

Házirgi waqıtta tábiyiy suw resurslardan paydalanıw hám ondaǵı biokóptúrlilikti qorǵaw áhmiyetli bolıp esaplanadı. Dúnyada dushshı suw jetispewshiligi barǵan sayın mashqalaǵa aylanıp barmaqta, bul bolsa bar bolǵan barlıq suw xorlarınan, sonnan irrigatsiya sisteması suw hawızlerinen ónimli paydalanıwdı talap etedi. Ásirese, suwdan kompleks paydalanıw sharayatında balıqshılıq tarmaǵın rawajlandırıw máseleleri dúnya jámiyetshiligin táshwishke salmaqta.

Mısalı,balıq ónimlerin asırıwda ishki suw xorlarında aw ixtiofaunasın jasalma formalandıırıw balıq xorları júdá az hámde máteriktiń elede ishki bóleginde jaylasqan Aral teńizi sıyaqlı suw hawızlerinde áhmiyetli boladı.Sonnan kelip shıǵıp,balıq ónimdarlıǵın asırıwda jaylaw akvakulturası sharayatında dóńmańlay balıqlardan paydalanıw texnologiyaların elede rawajlandırıw áhmiyetli ilimiy-ámeliy orın tutadı. [3].

Jáhánde ósimlikxor balıq túrleri tropik hám kontinental klimattıń qubla aymaqları jaylaw akvakulturası sharayatında jetilistiriletuǵın áhmiyetli balıq obiekleriniń biri sıpatında tán alınǵan.

Respublikamızda xalıq mútajligi hám bazar talaplarınan keli shıǵıp,balıq jetistiriw jıldan-jılǵa ósip barmaqta.Bul boyınsha,sonnan Ámiwdárya dáryası tómengi aǵımında jaylasqan Shıǵıs Qarateren kóli júdá áhmiyetli irrigatsion hám iri balıqshılıq hawızı bolıp,bul jerde balıqshılıqta kóp awlanatuǵın aq dóńkimańlay

(*Hypothalmichthys molitrix*) balıǵın jetistiriwge, elede túr sanın kóbeytiwge ayrıqsha itibar berilmekte. [1,3].

Tómendegi kestede organizmdıń jasına baylanıslı ósip-jetiliwin kórsetilgen. Jas asqan sayın onıń denesiniń uzınlıǵı hám ulıwma awırılıǵı artıp baradı.Jası kishilerinde organizm tez ósken, denesi uzarǵan, salmaǵı artqan. Keyingi jıllarda uzınlıǵınan kóre salmaǵı kóbirek artqan, yaǵnıy denesi tolısıp, iri bolıp qalıplesedi.

Uzınlıq hám awırılıqta berilgen aralıqlarda hár birewdiń ósimi birdey emes ekenin bildiredi.

Bul ayırmashılıqlar azıqlanıwına, ekologiyalıq jaǵdayına hám biologiyalıq ózgesheliklerine baylanıslı boladı. [2,6].

Keste-1

Qarateren kóli aq dóńmańlay balıqtıń empirik ósiwi.

Jası,jıl	Denesiniń standart uzınlıǵı, sm	Denesiniń ulıwma awırılıǵı gr
1+	12 – 27	18 – 294
2+	32 – 43	445 – 1200
3+	34 – 58	950 – 2600
4 +	60 – 78	3200 - 5280
5+ - 7+	70 – 98	4860 - 15520

Morfologiyalıq qásiyetleri. Úyrenilgen suw hawızindegi aq dóńmańlay balıǵı toparın ulıwma biologiyalıq analiz qılıw menen bir qatarda olardıń jınıslıq erjetken wákilleriniń tiykarǵı morfologiyalıq kórsetkishlerin de úyrenildi hám de meristik belgiler kórsetkishi hámde plastik belgileriniń koefficient kórsetkishi (denesiniń standart uzınlıǵına qatnası) boyınsha alınǵan maǵlıwmatlar kestede keltirilgen.

Biraq, populyatsion izertlewler ushın, tarqalǵan areli hám túrli jasaw sharayatlarındaǵı balıqlardısalıstırıwlaw ushın (jańa jaǵdayǵa iykemlesiw dawamında usı túr qaysı jóneliste

özgeriwine ataq beriw ushın) ixtiologiyada plastik belgilerdiń salıstırmalı kórsetkishleri keltiriledi (standart dene uzınlıǵına salıstırǵanda %). Aq dóńmańlaydıń bul kórsetkish boyınsha maǵlıwmatları kestege keltirilgen.

Keste-2

**Qarateren kóli jınıshlıq erjetken aq dóńmańlay balıqları
morfologiyalıq kórsetkishleri, 2025- jıl (n = 26)**

№	Kórsetkish	Min	Mak	Ortasha	Cv,%
1	Tumsıǵınıń uzınlıǵı	8,3	10,0	9,2	7,1
2	Kóz diametri (gorizontal)	2,9	3,8	3,4	9,4
3	Basınıń kóz arqa tárepi	17,3	19,8	18,3	4,7
4	Basınıń uzınlıǵı	26,0	30,4	28,8	5,6
5	Basınıń eńse bólimi biyikligi	16,6	25,6	22,1	16,8
6	Mańlay keńligi	13,7	18,8	16,6	10,8
7	Denesiniń salıstırmalı biyik bólimi	3,0	3,3	3,2	3,1
8	Denesiniń salıstırmalı kishi bólimi	10,9	12,8	11,8	6,1
9	Antedorsal bólimi	4,1	5,2	4,8	7,2
10	Postdorsal bólimi	4,0	4,3	4,2	3,2
11	Quyırq oqınıń uzınlıǵı	16,3	18,8	17,6	5,2
12	D tiykarınıń uzınlıǵı	10,6	12,9	11,6	5,8
13	D nıń salıstırmalı biyik bólegi	15,3	19,2	17,4	7,2
14	A tiykarınıń uzınlıǵı	14,8	17,9	15,9	5,7
15	A nıń salıstırmalı biyik bólimi	10,2	11,6	11,0	4,2
16	P uzınlıǵı	18,6	21,2	19,2	4,4
17	V uzınlıǵı	13,3	15,6	14,5	6,0
18	P hám V arasındagı aralıq	2,0	2,2	2,1	3,9
19	V hám A arasındagı aralıq	19,7	24,2	22,5	6,5
25	V hám A arasındagı aralıq	19,5	22,2	20,5	6,2

Eger ulıwma qabıl etilgen shamalardan kelip shıǵatuǵın bolsaq, variatsiya koeffitsienti kórsetkishi (Cv) 30% ge shekem bolsa úyrenilgen balıqlardıń birdeyliginen derek beredi, házirgi

dáwirge shekem aq dóńmańlay balıq túr ushın jańa bolǵan Aral teńizi háwizi sharayatına maslasıp úlirgen, ámelde barlıq kórsetkishleri derlik birdey. Eń ózgeriwsheń kórsetkishler, basınń jelke salasındaǵı biyikligi ($C_v = 16, 8\%$) hám mańlay keńligi ($C_v = 10, 8\%$) esaplanadı.

Haqıyqatında bul kórsetkishler usı túr balıqtıń qarıydarlar tárepinen onsha talap joqarı bolmaǵan dene bólimleri bolıp tabıladı. Usınıń menen birge denesiniń salıstırǵanda biyik bólegi eń ózgermeytuǵın kórsetkish ekenligi anıqlandı ($C_v = 3,1\%$), biraq bul kórsetkish usı túr balıqtıń tovar sapasın klassifikaciyalaydı. [2,5].

Awlanǵanına kóp bolmaǵan balıqlardıń shep tárepinen meristik belgileri sanaldı hám shtangentsirkul járdeminde plastik belgilerin ólshendi hámde olar denesiniń qabırshaǵı tawsılǵan jayǵa shekem bolǵan uzınlıǵı yaǵnıy standart uzınlıǵına qatnasın qayta esaplap shıqtıq.

Barlıq balıqlar denesiniń ulıwma salmaǵı (W, g) 1 grammǵa deyin anıqlıqta, denesiniń ulıwma uzınlıǵı (TL, sm) hám standart uzınlıǵı (SL, sm) 0, 1 sm anıqlıqta ólshendi.

Keste-3



Joqarıdaǵı diagrammada bir jazlıq shabaqlardıń dene kórsetkishleri-denesiniń ulıwma awırılıǵı, ulıwma uzınlıǵı hám standart uzınlıǵı boyınsha minimum, maksimum hám ortasha mánisleri keltirilgen. Alınǵan nátiyjeler balıqlarda morfometrik kórsetkishlerdiń belgili bir dárejede ózgeriwsheń ekenin kórsetedi.

Denesiniń ulıwma awırılıǵı 124 grdan 342 grǵa shekem aralıqta ózgerip, ortasha salmaq 210,6 g-dı quraýdı. Ulıwma uzınlıq kórsetkishi bolsa 22,5–32,5 sm aralıqta bolıp, ortasha 26,3 sm-ge teń. Standart uzınlıq bolsa 22–24,3 sm arasında ózgerip, ortashası 22,4 sm-di quraǵan.

Bul kórsetkishler bir jaslıq shabaqlardıń ósip-jetilisiw dárájesiniń hám biologiyalıq jaǵdayınıń qanaatlandırarlıq ekenin bildiredi. Minimum hám maksimum ólshemler arasındaǵı ayırma shabaqlardıń ósiw hám azıqlanıw jaǵdayı, ortalıqtıń ekologiyalıq faktorları men baylanışlı bolıwı múmkin.

Ulıwma alǵanda, berilgen morfometrik kórsetkishler populyaciya quramınıń birdey emesligin hám bir túr arasındaǵı biologiyalıq ózgeriwshenlikti kórsetedi.

Paydalanilgan ádebiyatlar.

1. Нуриев Х.Н. Акклимизированные рыбы водоемов бассейна реки Зеравшан-Ташкент.Фан.1985.
2. И.М.Мирабдуллаев,У.Т.Мирзаев “Ўзбекистон ва қушни ҳудудлар баликлари аниқлагичи”. Toshkent - 2011
3. Салихов Т.В., Камилов Б.Г. Рыбы Узбекистана (определитель).Ташкент:, 2001.
4. Ҳусенов С.Қ., Ниёзов Д.С., Сайфуллаев Ғ.М. Балиқчилик асослари.Бухоро. 2010.
5. Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб. Москва.: 1966.
6. Р.Тлеуов. Ш. Тлеубергенов. Рыбы Каракалпакии. Нукус.1974.
7. Аманов А.А. Акклиматизированные рыбы водоемов Узбекистана.Ташкент. 1990.
8. М.А.Лаханов. Ўзбекистоннинг умуртқали ҳайвонлар аниқлагисши. Toshkent.2013.